



GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 146 (18/88) du 27 OCTOBRE 1988

CEREALES : Vols massifs de pucerons. Risques de jaunisse nanisante élevés dans les semis précoces de blé, d'orge ou d'avoine.

COLZA : Continuer à surveiller les altises.

La Réunion de Melle aura lieu le Vendredi 2 Décembre.

Elle sera consacrée aux problèmes phytosanitaires des grandes cultures. Programme et bulletin d'inscription seront diffusés dans notre prochain bulletin.

CEREALES

JAUNISSE NANISANTE

Situation : Des vols massifs de pucerons vecteurs de la jaunisse nanisante sont observés actuellement, les premières colonisations sont en cours dans les parcelles levées à ce jour.

Préconisations : Parcelles ayant dépassé le stade 1 feuille et demi : intervenir rapidement.

Parcelles atteignant le stade 1 feuille et demi et situées dans des sols difficiles d'accès en période pluvieuse (marais, limons) : intervenir dès le stade 1 feuille et demi.

Parcelles en cours de levée : prévoir une intervention au stade 2 feuilles. En cas de colonisation importante avant ce stade (plus de 10 % de pieds porteurs de pucerons), avancer l'intervention au stade 1 feuille et demi.

COLZA

Les stades phénologiques s'échelonnent de B4 à B8.

INSECTES

Situation :

Pucerons : Les populations ont nettement chuté, suite aux traitements de début de mois.

Tenthredes : Les traitements sur larves de tenthrèdes ont été efficaces dans l'ensemble.

Altises : Les captures se sont intensifiées la deuxième décade d'octobre. Il convient de rester vigilant. Ces insectes restent en activité (dépôts de pontes) tant que la température moyenne journalière est supérieure à 7°.

Préconisation :

Parcelles non encore protégées : Il est urgent d'intervenir même en l'absence de pucerons et de tenthrèdes, pour limiter les dépôts de pontes d'altises.

Parcelles protégées autour du 10 Octobre : Une deuxième intervention n'est pas justifiée dans l'immédiat ; nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation dans notre prochain bulletin.

.../...



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE RÉGIONAL
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tel. : 49 58 39 02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant ~~XX~~ J.P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel 160F.
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

304P

760

HERBICIDES UTILISABLES EN POST-LEVÉE DU COLZA

Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
POST-LEVÉE PRECOCE			
métazachlore	BUTISAN S	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> - A utiliser dès le stade "cotylédons étalés - 1ère feuille pointante du colza". - La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles. - A la dose de 2,5 l, avant la levée des adventices : Bon sur Capselle, Coquelicot, Mouron. - Moyen sur Véronique et Pensée.
POST-LEVÉE			
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	<ul style="list-style-type: none"> - Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. - Application possible sur sol gelé. - Bonne action sur graminées ; insuffisante sur dicotylédones contre chiendent de Novembre à fin Janvier.
		5 à 6 kg	
propyzamide	KERB Flo	1,5 à 1,8 l	<ul style="list-style-type: none"> - A partir du stade 2 feuilles vraies du colza (B2) jusqu'à la reprise de végétation. - Application sur sol gelé. - Bonne action sur graminées. - Insuffisante sur dicotylédones contre Avoine à chapelet - contre Chiendent rampant.
		2,5 l 3,8 l	
propyzamide + diuron	KERB ULTRA *	1,2 kg	<ul style="list-style-type: none"> - A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuille naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver. - Bonne action sur graminées. - <u>Action limitante sur Sanve, Ravenelle.</u> - A utiliser par temps humide, couvert et frais. - Ne pas mélanger avec un antigrainée à action foliaire.
carbétamide + diméfuron	PRADONE TS	3,5 - 4 kg	<ul style="list-style-type: none"> - <u>A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés.</u> - Application possible sur sol gelé. - Action sur dicotylédones : <ul style="list-style-type: none"> - Efficace sur Véronique, Matricaire, Stellaire, Coquelicot, Lamier. - Irrégulier sur Pensée, Gaillet. - Insuffisant sur Sanve.
diméfuron + clopyralid	CLERDONE *	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> - Sur colza sain bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir du stade 4 feuilles vraies du colza. - Bonne action antidicotylédone. - Ne pas utiliser en mélange avec un antigrainée à action foliaire ; respecter 10 jours d'intervalle entre les traitements. Peut s'utiliser en mélange avec un antigrainée à action racinaire. - Sur Capselle : intérêt du programme : BUTISAN 1,5 l post-semis CLERDONE 2,5 l post-levée. - Sur Géranium : intérêt du programme : DEVRINOL 2,2 l post-semis CLERDONE 2,5 l post-levée.
clopyralid	LONTREL SF 100	0,75 l à 1,25 l + huile SCHERING 3 l/ha	<ul style="list-style-type: none"> - S'emploie de la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux. - Spectre d'action : composées (Matricaire, Anthémis, Chardon, Laiteron) et Légumineuses.

* Attention pas de mélange Kerb Ultra - Clerdone

P.161

ANTIGRAMEES SPECIFIQUES DE POST-LEVEE DU COLZA A ACTION FOLIAIRE

Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
aloxydime-sodium	FERVIN + huile	1 kg + 3 l huile 1 kg à 1,25 kg + 3 l huile	<ul style="list-style-type: none"> - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active en soirée si temps sec. - Action essentiellement sur graminées. - Contre graminées vivaces.
sethoxydime	FERVINAL	2 l + 3 l huile 3 l + 3 l huile SCHERING	<ul style="list-style-type: none"> - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). - Action essentiellement sur graminées. - Contre graminées vivaces.
fluazifop-p-butyl	FUSILADE X2 + AGRAL	0,75 l + 0,1 % vol. AGRAL 1,5 l + 0,1 % vol. AGRAL	<ul style="list-style-type: none"> - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). - Très bonne efficacité sur graminées. - Contre graminées vivaces.
haloxyfop-éthoxyéthyl	GALLANT	1 l - 2 l	<ul style="list-style-type: none"> - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Uniquement à l'automne. - Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). - Action essentiellement sur graminées. - Contre graminées vivaces et Pâturin.
quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l + 2 l huile SIFREN 3 l + 2 l huile SIFREN	<ul style="list-style-type: none"> - Quel que soit le stade du colza. - De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées. - Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec). - Action essentiellement sur graminées. - Contre Pâturin au stade 1 à 3 feuilles maximum et graminées vivaces.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation